

INPOOL® Dry Flowable

Wettable Granules (WG)

A systemic selective herbicide that controls a wide range of Nutsedges & broad-leaf weeds.

Active Ingredient:

Halosulfuron methyl 75%

Other ingredients 25%

تحذير: احفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال
Warning: Keep out of reach of children

Manufacturing: Nissan Chemical Industries, LTD

Country of Origin: Japan

MOCCAE Registration Number: DXB-AD-140-1693

Local Distributor: Al Mubarak Agro-Chemicals,

PO.Box 13365, Dubai, UAE

Tel: 04-2237891

Net Contents: 200g x 40

Product Description:

Inpool is a selective post-emergent herbicide for control of Sedges (yellow nutsedge) in turf grasses, lawns, landscaped areas and listed broadleaf weeds.

Mode of Action:

Inpool works by binding to the acetolactate synthase (ALS) enzyme and preventing the formation of amino acids which are essential for plant growth and weed survival. Inpool has foliar and/or soil activity on target weeds. Inpool is effective on both large-seeded and small-seeded broadleaf weeds as well as yellow.

Precautionary Statements:

Dilute the amount set for this herbicide with the amount of water determined. Choose the right time for spraying the herbicide because it is essential to use it at the initial period of growth and before the growth of the harmful wild grasses. Gramineous weeds are strongly resistant to herbicide, therefore Inpool should be used with effective soil regulator combination. Avoid spraying flowers & trees close to the target area to prevent them from exposure. Do not use this herbicide at high temperature during the dry season, as it may harm the plants. Wash the equipment used for spraying after use. When used for the first time particularly, be careful with the quantity, time of use, method of use, bad weather & etc.

انبول درای فلوابل

حببيبات ذائبة بالماء

مبيد أعشاب جهازى اختياري لمكافحة السعد وبعض الأعشاب عريضة الأوراق

المواد الضعالة :

هالوسلفيرون ميثيل ٧٥%

المواد الخاملة ٢٥,٠%

الشركة المصنعة : نيسان كيميكال إنستريز

بلد المنشأ : اليابان

رقم التسجيل بوزارة التغير المناخي والبيئة :

الشركة المستوردة : المبارك للتكياويات الزراعية,

ص.ب ١٢٢٦٥ - دبي - الإمارات العربية المتحدة

تليفون : ٢٢٣٧٨٩١ - ٤

المحتوى الصافي : ٢٠٠ جم x ٤٠

وصف المبيد :

إنبول مبيد حشائش جهازى - اختياري يستخدم بعد الإنبات للقضاء على السعد الأصفر في المسطحات الخضراء، الحدائق وكذلك يقضي على بعض الأعشاب العريضة.

طريقة التأثير:

إنبول يعمل على ربط الزيم أسيتولاكتيت ومنع تكون الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وبقاء الأعشاب. مبيد إنبول يستخدم رشا على الأعشاب المستهدفة وله نشاط عند إضافته على التربة. مبيد إنبول فعال على بذور الأعشاب العريضة (الصغيرة والكبيرة) وكذلك على السعد الأصفر.

التحذيرات:

خفف كمية المبيد المحدد استخدامها مع الكمية المحددة من الماء. اختر الوقت المناسب لرش المحلول، لأنه يتوجب الرش مع بداية النمو وقبل نمو الأعشاب الضارة. أعشاب العائلة النجيلية مقاومة للمبيدات العنقية، لذا يجب أن يستخدم إنبول مع منظمات التربة ذات التركيبات الفعالة. تجلب رش المحلول على الأزهار والأشجار المحيطة للمنطقة المستهدفة لمنع تعرضهم للمبيد. لا تستخدم المبيد في الأجواء الجافة مع ارتفاع درجات الحرارة لأنه قد يؤدي إلى ضرر بالنباتات. اغسل المعدات المستخدمة لرش المبيد جيداً بعد الاستخدام. خاصة عند استخدام المبيد لأول مرة كن حذراً فيما يتعلق بكمية المبيد، وقت الاستخدام، طريقة الاستخدام أو في ملقن سيء وإلخ.

Direction of use & Dose rates

طريقة ومعدل الاستخدام :

Type of Turf نوع المسطحات الخضراء	Name of Wild Grass Used العشب المستهدف	Time of Use وقت الاستخدام	Use / 1000 m2 معدل الاستخدام / ١٠٠٠ متر مربع
Japanese Grass العشبة اليابانية	Grassy perennial weeds الأعشاب النجيلية المعمرة -Himekugu weed (Cyperus brevifolius) السعد الأصفر	Grass early growth period— Growing period (Before the wild grass grows - Initial growth phase)	30 gm - 50gm In 200 - 300 liter of water
Western Grass (Bent-grass)/ (Blue Grass) العشبة الغربية (بلوجراس) / (بلوجراس)	Broad leaf Weeds الأعشاب عريضة الأوراق	المرحلة المبكرة في نمو الحشائش -مرحلة النمو (قبل نمو العشب البري- مرحلة النمو الأولى)	٣٠ جرام - ٥٠ جرام في ٢٠٠ إلى ٣٠٠ لتر ماء
Warm Season Grass: - Bahiagrass (Paspalum notatum) - Seashore paspalum (paspalum vaginatum) - Bermudagrass (Cynodon dactylon) - St. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum) - Centipedegrass (Eremochloa ophiuroides) - Zoysiagrass (Zoysia japonica) - Kikuyugrass (pennisetum)		When nutsedge reaches 3 - 8 leaf stage	5 gm - 10 gm
Cool Season Grass: - Bentagrass, creeping (Agrostis Stolonifera) - Fescue, fine (Festuca rubra) - Bluegrass, Kentucky (Poa pratensis) - Ryegrass, perennial (Lolium perenne)		عند وصول عمر السعد إلى عمر ٣ - ٨ ورقات	٥ جرام - ١٠ جرام

Batch no.:

P.Date:

E.Date:

رقم التشغيل:

تاريخ الإنتاج:

تاريخ الانتهاء: